

**ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU CỦA NGƯỜI BỆNH TRONG BA NGÀY ĐẦU  
SAU PHẪU THUẬT MỜ BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP  
BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN NĂM 2017**

Bùi Văn Khanh<sup>1</sup>, Nguyễn Hữu Đức<sup>2</sup>, Dương Thị Tố Anh<sup>1</sup>,  
Ngô Minh Quang<sup>2</sup>, Vũ Văn Tiến<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Trường Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên  
<sup>2</sup>Bệnh viện Quân y 103

**TÓM TẮT**

**Mục tiêu:** Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mờ bướu giáp đơn thuần tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:** 112 người bệnh phẫu thuật bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện A Thái Nguyên. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. **Kết quả:** Giá trị trung bình đau sau phẫu thuật tại thời điểm đánh giá ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ 3 lần lượt là  $4,19 \pm 2,05$ ;  $3,23 \pm 1,07$ ;  $2,12 \pm 1,05$ . Trong đó, điểm số đau trung bình tại thời điểm đánh giá ngày thứ nhất có điểm số cao nhất và giảm dần ở những ngày sau đó. **Kết luận:** Trong ba ngày đầu sau phẫu thuật, mức độ đau của người bệnh giảm dần. Đau nhiều nhất vào ngày đầu tiên, giảm dần vào ngày thứ 2 và đau ít hơn vào ngày thứ ba sau phẫu thuật.

**Từ khóa:** Phẫu thuật bướu giáp, đau sau phẫu thuật.