ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TẢI LƯỢNG VIRUS VIÊM GAN B Ở PHỤ NỮ MANG THAI CÓ HBsAg (+) TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017

Trần Trung Anh[1], Nguyễn Thị Huyền[1], Nguyễn Hồng Phúc[1],Đàm Bảo Lợi[2], Hoàng Xuân Hiếu[2]
[1]Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, [2]Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 38 thai phụ mang thai 3 tháng cuối có HBsAg (+), quản lý thai nghén và sinh con tại Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 4/2017 đến 10/2017 nhận thấy: Tỷ lệ thai phụ có nồng độ Log10 HBV DNA<2 copies/ml là 23,7%, Log10 HBV DNA từ 2-5 copies/ml là 28,6%, Log10 HBV DNA >5 copies/ml là 47,4%, tỷ lệ thai phụ HBeAg(+)/HBsAg(+) là 47,4%. 88, 9% trường hợp HBeAg (+) có log10 HBV DNA >5, 90% trường hợp HBeAg (-) có log10 HBV DNA <5, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 66,7% trường hợp HBeAg (+) có nồng độ ALT ≥ 2 lần giá trị bình thường, chỉ có 33,3% trường hợp HBeAg (-) có nồng độ ALT ≥ 2 lần giá trị bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Enzym ALT tăng cao trên 2 lần giá trị bình thường ở nhóm có Log10 HBV DNA >5. Giá trị ALT trung bình của nhóm có Log10 HBV DNA >5 cao hơn nhóm Log10 HBV DNA <5.

***Từ khóa**: Virus viêm gan B, phụ nữ mang thai, HBV DNA*